

[高い安全性]

試験項目	結 果
皮膚一次刺激性	刺激反応なし（無刺激性）
眼刺激性	刺激反応なし（無刺激性）
急性経口毒性	異常なし（LD50＞2000mg/kg）
皮膚感作性	感作性なし
急性吸入毒性	異常なし（LD50＞5000mg/m3）

試験機関：日本食品分析センター／住化分析センター

[ウイルスへの効果]

エンベロープ有無	試験ウイルス	濃 度	対数減少値（減少率％）	
			15秒後	60秒後
有	Aウイルス	25ppm	> 5.0 (99.999%以上)	> 5.0 (99.999%以上)
無	Bウイルス	25ppm	5.4 (99.999%以上)	> 6.5 (99.999%以上)

試験機関：北里環境科学センター 試験方法：試験管内に消臭除菌水0.9mLとウイルス液0.1mLを作用させTCID50法で測定

[細菌への効果]

分 類	試験菌	濃 度	対数減少値（減少率％）	
			15秒後	5分後
真 菌	Hカビ	25ppm	1 (90%以上)	> 4.6 (99.997%以上)
芽胞菌	I 菌	25ppm	—	> 4.7 (99.998%以上)

試験機関：日本食品分析センター 試験方法：試験管内に消臭除菌水10mLと菌液0.1mLを作用させた後、生菌数を菌数測定用培地で測定